Purilon

# Gebruiksaanwijzing




**Purilon** Gel

1. Verwijder het label van de harmonicaverpakking door aan het hoekje te trekken.
2. Reinig het mondstuk met een antisepticum.
3. Verwijder de dop met een draaiende beweging. Plaats middel- en wijsvinger op de aangegeven plaats.
4. Druk zachtjes met de handpalm op de onderkant van de harmonicaverpakking om **Purilon** Gel in de gehele wond met een dikte van ten minste 5 mm aan te brengen.

**Beschrijving**
**Purilon** Gel is een heldere, amorfe hydrogel voor effectief autolytisch debridement van necrotisch weefsel.

**Indicaties**
**Purilon** Gel is hoofdzakelijk geïndiceerd bij de behandeling van necrose of geel beslag bij onder meer ulcus cruris, decubitus en niet geïnfecteerde diabetische voet ulcera.

**Purilon** mag eveneens toegepast worden bij 1e en 2e graads brandwonden.

De gel kan gedurende het gehele genezingsproces toegepast worden om een vochtig wondmilieu te verkrijgen in alle wondtypen, met uitzondering van de wonden die onder "voorzorgsmaatregelen" staan vermeld.

**Gebruiksaanwijzing**
Reinig de wond met een fysiologische zoutoplossing of met leidingwater. Dep de huid rondom de wond voorzichtig droog.

Breng **Purilon** Gel aan volgens de illustraties om een optimaal gebruik te realiseren. Bedek het met een secundair wondverband.

Optimale reiniging van necrose of geel beslag wordt verkregen als **Purilon** regelmatig wordt vervangen. **Purilon** Gel kan maximaal 3 dagen in de wond achterblijven.

Bij "propere" wonden wordt **Purilon** vervangen afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.

Verwijder de gel door de wond te spoelen met fysiologisch zout of kraanwater.

**Voorzorgsmaatregelen**
**Purilon** kan gebruikt worden op patiënten met lokale en systemische infecties indien de infectie onder medische controle staat. Diabetische wonden (onderbeen en voet) en wonden veroorzaakt door arteriële insufficiëntie moeten frequent worden onderzocht door een arts of verpleegkundige, afhankelijk van de klinische conditie.

Alleen voor uitwendig gebruik.

Neem in geval van allergische reacties contact op met Coloplast voor informatie omtrent de bestanddelen van **Purilon** Gel.

**Purilon** Gel vergemakkelijkt het verwijderen van necrotisch weefsel (debridement) tijdens de reinigingsfase. De wond kan bij de eerste verbandwisseling groter lijken. Debridement is echter een essentiële stap in het wondgenezingsproces.

**Overige**

**Bestanddelen**
Gezuiverd water. Natrium carboxymethylcellulose.
Calcium alginaat.

**Opslag**
**Purilon** Gel dient op kamertemperatuur bewaard te worden. Vermijd direct zonlicht.

**Sterilisatie**

Indien de steriele verpakking beschadigd is, het product niet gebruiken of hersteriliseren.
Voor éénmalig gebruik.

**Work Order**
Productienummer dat identificatie van de verpakking van een bestelling voor een specifiek land mogelijk maakt (LOT-nummer verwijst naar productie eenheid).

CE
0543